

TOXOPLASMOSIS Y EMBARAZO

Dr. Germán E. Chacón V.
Gineco-Obstetra
Coordinador de la C. A. R. O.



PRINCIPAL CAUSA DE ANGUSTIA DEL MEDICO Y SU PACIENTE



Inmunoabsorción enzimática (ELISA)


- ★ Interacción antígenos-anticuerpos conjugados con enzimas.

Ventajas:

Automatización
Sensibilidad
Especificidad

Desventajas:

Variabilidad en los resultados
Falsos positivos



Diagnóstico Serológico

<i>Ig G</i>	<i>Ig M</i>	<i>Ig A</i>	<i>Avidez</i>	<i>Dx</i>
Negativo	Negativo	Negativo	-	NO existe infección, tomar medidas preventivas
Negativo	Positivo	Negativo	Baja	Infección aguda probable
Negativo	Positivo	Positivo	Baja	Infección aguda probable
Positivo	Positivo	Positivo	Baja	Infección aguda probable
Positivo	Positivo	Positivo	Alta	Infección crónica
Positivo	Positivo	Negativo	Alta	Infección crónica
Positivo	Negativo	Negativo	Alta	Infección crónica

TRATAMIENTO



E. G. menor a 20 semanas

Espiramicina (Provamicina)

3 gr/d V. O. (TID) por tres semanas

Control de laboratorio

Si los títulos disminuyen: Suspenderlo

De no haber disminución: Repetirlo

TRATAMIENTO

E. G. mayor a 20 semanas

Sulfadiazina

2 gr/d V. O. (TID) por tres semanas

+

Pirimetamina (Daraprim)

25 mg/d V. O. (BID) por tres semanas

Control de laboratorio

Si los títulos disminuyen: Suspenderlo

De no haber disminución: Repetirlo



GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

webdelprofesor.ula.ve/medicina/gerchavi/